
Regionaal Protocol

Fluxus en/of MPV in de anamnese

Fluxus in anamnese

Definitie fluxus (HPP):

Vaginaal bloedverlies post partum met een hoeveelheid van 1000 ml of meer.

VIL over HPP i.a.:

- Fluxus uit episiotomie/ruptuur → 1^e lijns indicatie (A)
- Fluxus uit cervixruptuur → plaats indicatie (B-D) onder leiding van 1^e lijn
- Fluxus andere oorzaken (uterusatonie, vastzittende placenta, etc) → plaats indicatie (B-D) onder leiding van 1^e lijn
- Indien er een fluxus tijdens de 1^e partus was, maar tijdens de 2^e partus een normale hoeveelheid bloedverlies, dan is de 3^e partus weer een 1^e lijns indicatie (A)

Fluxus 1000-1500cc i.a.

Graviditeit

- Geen consult nodig.

Partus

- Plaatsindicatie (B-D), partus o.l.v. 1^e lijns verloskundige.
- 1^e lijns verloskundige vermeldt telefonisch bij aanmelding partus op VK dat het om een cliënte gaat met een fluxus i.a. die met een plaatsindicatie komt bevallen.
- Bij aankomst op VK warme overdracht volgens SBARR en van zwangerschapskaart. Op VK waaknaald (zonder infuus) in situ brengen en kruisstolbloed afnemen door 1^e lijns verloskundige.

NB: Indien dit niet lukt; dd klinisch verloskundige/arts assistent of verpleegkundige om hulp vragen (geen consult). Vraag op VK na om welke buizen het gaat en wie het naar het lab wil brengen. **Let op;** stickers op de buizen voor ze de kamer verlaten!

- Zorg voor een lege blaas voor de uitdrijving (katheterisatie)
- Actief nageboortetijdperk
- Overdracht/consultatie 2^e lijn indien:
 - o Het huidige bloedverlies >500 ml is en (naar verwachting) nog niet is gestabiliseerd**en/of**
 - o De placenta na 30 minuten nog niet spontaan is geboren
 - o CAVE weeënzwakke / langdurige baring! Laagdrempelig overleg met 2^e lijn.

Fluxus >1500cc i.a.

Graviditeit

- Consult gynaecoloog

Partus

- Overdracht durante partu
- 1^e lijns verloskundige vermeldt telefonisch de overdracht i.v.m. fluxus >1500cc i.a.
- Verloskundige gaat mee naar het ziekenhuis voor warme overdracht volgens SBARR en van zwangerschapskaart.

MPV in anamnese

VIL over MPV i.a.:

- MPV i.a. → plaatsindicatie (B-D)
- MPV i.a. bij placenta accreta → 2^e lijns indicatie (C)
- Indien er een MPV tijdens de 1^e partus was, maar tijdens de 2^e partus niet, dan is de 3^e partus weer een 1^e lijns indicatie (A)

Graviditeit:

- Geen consult nodig

Partus:

- Plaatsindicatie (B-D), partus o.l.v. 1^e lijns verloskundige.
- 1^e lijns verloskundige vermeldt telefonisch bij aanmelding partus op VK dat het om een cliënte gaat met een MPV i.a. die met een plaatsindicatie komt bevallen.
- Bij aankomst op VK warme overdracht volgens SBARR en van zwangerschapskaart.
- Zorg voor een lege blaas voor de uitdrijving (katheterisatie)
- Actief nageboortetijdperk
- Overdracht/consultatie 2^e lijn indien
 - o Het huidige bloedverlies >500 ml is en (naar verwachting) nog niet is gestabiliseerd**en/of**
 - o De placenta na 60 minuten nog niet spontaan is geboren
- Indien MPV i.a. gepaard is gegaan met een fluxus; beleid 'fluxus i.a.' volgen (zie boven).