


Observatie bij overig psychofarmaca gebruik



Deze folder is gemaakt door de afdeling Neonatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden



Gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter!

Uw kind is gedurende minimaal 24 uur geobserveerd in ons ziekenhuis, omdat moeder tijdens de zwangerschap een medicijn heeft gebruikt uit de groep van tricyclische antidepressiva, benzodiazepinen en/of antipsychotica. Deze medicatie kan via de navelstreng ook bij de baby terecht komen. Na de geboorte stopt de toevoer van dit medicijn. Uw baby kan gewend zijn geraakt aan het medicijn, waardoor hij of zij door het wegvallen hiervan ontregeld kan raken. De verschijnselen die dan optreden noemen we ontwenningsverschijnselen.

Tijdens de observatie in ons ziekenhuis is goed gekeken of deze verschijnselen ontstaan. Maar ook thuis is het belangrijk de observatie door te zetten. Met deze folder willen wij u graag informeren hoe u dit kunt doen, samen met de kraamverzorgende en verloskundige.

Observatie in het ziekenhuis

De kans op het zichtbaar worden van ontwenningsverschijnselen bij uw kind is in de eerste uren na geboorte het grootst. In het ziekenhuis is uw kind voor minimaal 24 uur geobserveerd door de verpleegkundigen en artsen. Gedurende deze observatie zijn er geen tekenen gezien die wijzen op ernstige ontwenning aan het medicijn bij uw baby. Dit betekent dat u naar huis mag. Ook na de periode in het ziekenhuis zijn ontwenningsverschijnselen nog mogelijk, hoewel de kans kleiner is. Meestal treedt dit binnen de eerste 3 dagen na de geboorte op. Daarom is het belangrijk thuis uw kind ook goed in de gaten te blijven houden.

Observatie thuis

Wij vragen u om, samen met de verloskundige en de kraamverzorgende, goed op de volgende symptomen te letten:

- Minder goed drinken
- Prikkelbaarheid en veel huilen

Bij het gebruik van een medicijn uit de groep tricyclische antidepressiva, let dan ook op:

- Verhoogde spierspanning
- Temperatuur lager dan 36.0°C, rectaal gemeten
- Spiertrillingen
- Niet of zeer weinig plassen

Bij het gebruik van een medicijn uit de groep antipsychotica, let dan ook op:

- Slap zijn of niet reageren
- Rare, onwillekeurige bewegingen of trillingen

Bij het gebruik van een medicijn uit de groep benzodiazepinen, let dan ook op:

- Heel stijf zijn of juist heel slap
- Niet goed doorademen
- Niet goed reageren
- Temperatuur lager dan 36.0°C of juist hoger dan 38.0°C, rectaal gemeten

Neem contact op met uw verloskundige, wanneer u bij uw kind één van deze symptomen ziet, of daarover twijfelt. Wanneer uw kraamtijd voorbij is en u geen verloskundige of kraamverzorgende meer heeft, neem dan contact op met uw huisarts of huisartsenpost.

[Versie Juli 2018]