
Regionaal Protocol

Verwijsbeleid acute situaties Rijnland ZH

Overdracht vanuit eerste lijn : communicatie met klinisch verloskundige.

Met 'gynaecoloog wordt in huis gebeld' wordt bedoeld: gynaecoloog wordt gebeld door de klinisch verloskundige. Bij alle acute situaties directe toelating tot de VK voor de samenwerkingspraktijken.

Verwijsindicatie	acuut	sub-acuut
Afwijkende ligging , heftig in partu: bij alle afwijkende liggingen anders dan stuit wordt direct gynaecoloog in huis gebeld.. Bij verdenking stuitligging wordt gynaecoloog op de hoogte gebracht, klinisch verloskundige brengt eerst situatie in beeld.	X	
Foetale nood/ cortonen pathologie : Bij persistente bradycardie wordt gynaecoloog direct in huis gebeld. Bij andere cortonen pathologie wordt de situatie eerst door klinisch verloskundige in beeld gebracht.	X	
Verdenking foetale sterfte durante partu : gynaecoloog wordt direct in huis gebeld	X	
Niet vorderende uitdrijving : Klinisch verloskundige brengt eerst situatie in beeld. Icm cortonenpathologie wordt gynaecoloog direct in huis gebeld.		X
Overmatig bloedverlies durante partu of na miskraam : Na miskraam wordt gynaecoloog direct in huis gebeld. Bij bloedverlies durante partu in geval van > 500cc bloedverlies en/ of suboptimale cortonen wordt de gynaecoloog direct in huis gebeld. In andere situaties brengt klinisch verloskundige eerst situatie in beeld.	X	
Partus prematurus <35 weken , heftig in partu: Wordt door klinisch verloskundige in beeld gebracht. Icm afwijkende ligging of cortonenpathologie wordt gynaecoloog direct in huis gebeld.	X	
Partus prematurus > 35 weken en < 37 weken , heftig in partu: klinisch verloskundige brengt situatie in beeld.		X

Verdenking solutio placentae: Gynaecoloog wordt direct in huis gebeld	X	
Verdenking vasa praevia: Gynaecoloog wordt direct in huis gebeld	X	
Uitgezakte navelstreng: Gynaecoloog wordt direct in huis gebeld	X	
Achterblijven van (een deel van) de placenta bij >1000cc bloedverlies en/of hemodynamisch instabiele vrouw: gynaecoloog wordt direct in huis gebeld. < 1000cc bloedverlies en stabiele vrouw: klinisch verloskundige brengt eerst situatie in beeld	X	
Zwangere met eclampsie: Gynaecoloog wordt direct in huis gebeld	X	
Meconiumhoudend vruchtwater, goede cortonen: klinisch verloskundige brengt situatie in beeld		X
Koorts durante partu : Klinisch verloskundige brengt situatie in beeld		X
Vulva haematoom: Klinisch verloskundige brengt situatie in beeld.		X
Geen voorgaande prenatale zorg, heftig in partu: Klinisch verloskundige brengt situatie in beeld	X	
Fluxus post partum Bij > 1500cc bloedverlies, instabiele vrouw en/ of verdenking placentarest wordt gynaecoloog direct in huis gebeld In andere gevallen brengt klinisch verloskundige eerst situatie in beeld.	X	
Plaatsindicatie, heftig in partu: klinisch verloskundige brengt situatie in beeld		X
Kind in slechte conditie: Gynaecoloog hoeft niet gebeld te worden, gaat om spoedindicatie voor kinderarts. Moeder wordt toegelaten tot VK/ suite.	X	