

Praktijkaart Drugs in de verloskundigenpraktijk

Vragen tijdens de intake

- Drugsgebruik in verleden? Zo ja, welke?
- Drugsgebruik recentelijk? Zo ja, welke?
- Drugsgebruik partner?
- Indien vorige vragen positief beantwoord ook vragen naar sociale kaart en evt. problematiek die met drugsgebruik samenhangen.

De anamnese is positief bij drugsgebruik afgelopen jaar + alle gegronde redenen waarvoor verdenking drugsgebruik bestaat (bijv. drugsgebruik door partner of drugsgebruik vorige graviditeit).

Soort	Afkap-waarde	Periode van detecteerbaarheid na laatste gebruik
Amfetaminen (HARDDRUGS) (amfetamine/XTC/MDEA)	1000µg/l	2-3 dagen
Cannabinoiden (SOFTDRUGS) (Marihuana/hasj/THC)	50 µg/l	Licht gebruik: 1-7 dagen Matig/zwaar gebruik: tot 1 maand
Cocaine (HARDDRUGS) (coke/crack)	300 µg/l	2-3 dagen Zwaar gebruik: tot 8 dagen
Opiaten (HARDDRUGS) (morfine/heroïne/codeïne)	300 µg/l	1-3 dagen
Benzodiazepines (SOFTDRUGS) (diazepam/temazepam/oxazepam/(flu)nitrazepam)	200 µg/l	1-7 dagen

Positieve anamnese

Direct bij intake urinetest doen

- Voorlichten over risico's drugsgebruik in zwangerschap
- Erop toezien dat mw. zelf plast!
- Potje of buisje labelen waar mw. bij zit
- Zorg dragen dat urine <24u in het laboratorium is (als dit niet lukt urine koel bewaren), **kopie ID client meenemen, zet door kopie met dikke letters ; KOPIE!**
- Aangeven dat er mogelijk nogmaals onaangekondigd een urinemonster gevraagd zal worden

Urinetest negatief

Urinetest **positief** voor softdrugs

Urinetest **positief** voor harddrugs

- Verwijzing 2^e lijn
- Overleg Huisarts (kan zonder toestemming cliënt) en evt andere zorgverleners (alleen na toestemming cliënt);
- Intake PND regelen
- AMK melding maken (iom 2^e lijn)

- Waarschuwing
- Urinetest onaangekondigd herhalen bij AM 22-24wk

Urinetest negatief

Urinetest **2^x positief** voor softdrugs

- Overleg 2 lijn, evt plaatsindicatie bij gyn regelen.
- Prenataal consult bij Kinderarts
- Overleg Huisarts
- Overleg evt. andere zorgverleners (alleen na toestemming cliënt)
- CJG op de hoogte brengen (toestemming cliënt nodig)

Herhaling urinetest bij AM 30 weken

Urinetest negatief

Geen verdere actie

Risico's drugsgebruik

Canabinoiden: abortus, EUG, IUGR, ontwikkelingsstoornissen.

XTC: cong. afw. (hart en ledematen).

Cocaine: abortus, cong. afw. (skelet/hart/urinewegen), microcephalie, partus prem., solutio, hypertensie, IUGR, IUVD, gedragsproblematiek (leren/aandacht/zelfbeheersing/taal).

Opiaten: miskraam, IUGR, IUVD, cong. afw., infecties, partus prem., solutio, absintieverschijnselen, abnormal neurologische ontwikkelingen, leer- en gedragsproblematiek.

Benzodiazepines: cong. afw., onttrekkingsverschijnselen (ademhalingsdepressie/hypotonie/convulsies).