

---

## Regionaal Protocol (sub)Totaalruptuur i.a.

---

### Follow-up na (sub)totaalruptuur:

- Nacontrole 6 weken postpartum
- Vervolgcontrole 3 maanden post partum; endo-echo en/of manometrie
  - o Advies t.a.v. modus partus bij eventuele volgende graviditeit wordt gegeven aan de hand van de resultaten.
  - o Zo nodig vervolgcontroles bij restschade/-klachten

### **Beleid bij zwangeren uit de 1e lijn met totaalruptuur i.a.**

#### Consult gyn in huidige graviditeit, inclusief endo-echo indien:

- Er nog geen follow-up heeft plaatsgevonden na eerdere (sub)totaalruptuur. Dit is onafhankelijk van eventuele persisterende klachten, want ook zonder klachten kan er sprake zijn van een afwijkende endo-echo of manometrie.
- Er sprake is van functionele restklachten en/of pijnklachte

#### **NB:**

*Consulten bij bekkenbodemspecialist plannen (dr. Vd Does en/of dr. Mous) op poli Alrijne Leiden (zowel voor GHIL als voor Alrijne Leiderdorp)*

#### Counseling t.a.v. volgende baring:

- Recidiefkans totaalruptuur na een eerdere totaalruptuur 4-8%
- Er is geen bewijs dat een episiotomie een totaalruptuur voorkomt
- Er is geen bewijs dat het verrichten van een sectio de kans op het optreden van faecale incontinentie vermindert, dan wel het risico op verergering van reeds bestaande faecale incontinentie verkleint.

Naar aanleiding van het consult wordt er een advies t.a.v. modus partus uitgegeven.