


Observatie bij maternaal lithium gebruik



Deze folder is gemaakt door de afdeling Neonatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden



Gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter!

Uw kind is gedurende minimaal 24 uur geobserveerd in ons ziekenhuis, omdat moeder tijdens de zwangerschap lithium heeft gebruikt. Lithium kan via de navelstreng ook bij de baby terecht komen. Lithium kan schadelijk zijn en bijwerkingen geven aan uw baby. Het is daarom belangrijk dat hij of zij in ons ziekenhuis aan de monitor wordt geobserveerd. Tijdens deze observatie is goed gekeken of er verschijnselen ontstaan. Maar ook thuis is het belangrijk de observatie door te zetten. Met deze folder willen wij u graag informeren hoe u dit kunt doen, samen met de kraamverzorgende en verloskundige.

Observatie in het ziekenhuis

De kans op het zichtbaar worden van symptomen bij uw kind is in de eerste uren na geboorte het grootst. In het ziekenhuis is uw kind voor minimaal 24 uur geobserveerd door de verpleegkundigen en artsen. Gedurende deze observatie zijn er geen tekenen gezien die wijzen op bijwerkingen van lithium bij uw baby. Dit betekent dat u naar huis mag samen met uw kind. Maar ook na de periode in het ziekenhuis zijn verschijnselen nog mogelijk. Daarom is het belangrijk thuis uw kind goed in de gaten te blijven houden.

Observatie thuis

Wij vragen u om, samen met de verloskundige en de kraamverzorgende, goed op de volgende symptomen te letten:

- Minder goed drinken
- Trillerig zijn
- Veel huilen, onrustig zijn
- Slap zijn
- Diarree
- Temperatuur lager dan 36.0°C of hoger dan 38.0°C, rectaal gemeten
- Heel veel plassen
- Veel afvallen of niet groeien

Neem contact op met uw verloskundige, wanneer u bij uw kind één van deze symptomen ziet, of daarover twijfelt. Wanneer uw kraamtijd voorbij is en u geen verloskundige of kraamverzorgende meer heeft, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

[Versie Juli 2018]