

Rubella = Rode Hond

Contact < 10 dagen:

*IgG bepaling: Indien niet bepaald dan uit spijserserum
*IgG positief geen vervolg beleid
*IgG negatief, 3 weken **na** contact IgG en IgM herhalen
*IgG weer negatief, dit wekelijks tot 6 weken na contact bepalen: wordt IgG positief: infectie! (IgM is aspecifiek, kan ook stijgen bij ander ziektebeeld)

Contact > 10 dagen < 7 weken:

*IgG bepaling: indien niet bepaald dan uit spijserserum(cave datum)
*IgG negatief, dan beleid zoals hier links beschreven
*IgG positief, dan IgM bepalen:
IgM negatief: oude infectie
IgM positief: recente infectie

Verwijzing naar LUMC
bij recente infectie

Bij een bewezen infectie t/m 16 weken in overleg met ouders termineren van de zwangerschap. Bij het continueren van de zwangerschap zo snel mogelijk hyperimmuun serum toedienen.

- besmettelijk van 5 dagen voor tot 5 dagen na het uitbreken van exantheem.
- incubatie tijd 14-21 dagen.
- **In de zwangerschap alleen rubella mee bepalen bij allochtone vrouwen of wanneer het onbekend is of de zwangere ooit gevaccineerd is.**
- Indien iemand geen antistoffen heeft dan vaccinatie na de borstvoedingsperiode of minimaal 12 weken (vlgs bijsluiter vaccin) voor volgende zwangerschap. Advies: BMR vaccinatie (is organisatorisch het handigst).