


Protocol 'code rood' VSV Leiden (acute situatie prehospitaliaal)



Acute situaties prehospitaliaal:

Perinataal

- Uitgezakte navelstreng
- Eclampsie
- Fluxus (ante, durante of post)
- Foetale nood
- Verdenking abruptio/solutio
- Verdenking gerupteerde vasa praevia
- Retentio placentae
- Partus prematurus
- Liggingsafwijking in partu
- Overige maternale bedreigde vitale functies
- Septische shock

Neonataal

Bedreigde neonatale vitale functies:

- Geen of insufficiënte ademhaling
- Slap en/of niet reactief
- Ernstige en/of persisterende (>1 uur) bleekheid/cyanose
- Hartactie persisterend >160/min of <100/min

NB: Bij twijfel over conditie van de neonaat maar geen duidelijke tekenen van levensbedreigende situatie

² Alrijne Ziekenhuis: dienstdoende verloskundige: 0715828838
LUMC: dienstdoende AIOS: 071 5269417

³ De vitaal bedreigde neonaat moet (ongeacht de zwangerschapsduur) ZO SNEL MOGELIJK naar in principe het DICHTSBIJZIJNDE ziekenhuis met adequate opvang worden gebracht en gestabiliseerd. Secundair vervoer naar een NICU-centrum kan vanuit daar onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. In zo'n geval is het zinvol dat de kinderarts het NICU-centrum op de hoogte brengt, dat evt. parallelle actie kan ondernemen in de zin van het opstarten van het NICU transport.

⁴ Bij gebruik van dit protocol wordt de zorg nadien altijd geëvalueerd.