
Regionaal Protocol
Laagliggende placenta

Wat is een laag liggende placenta?

Indien bij 34 weken de placenta < 2 centimeter van het ostium ligt. In dit geval is er post partum een verhoogde kans op een fluxus omdat het onderste uterus segment moeizamer kan contraheren.

Beleid

Indien bij 34 weken de placenta > 2 centimeter van het ostium ligt dan is er geen actie nodig.

Indien bij 34 weken de placenta 1-2 centimeter van het ostium ligt dan een

- Plaatsindicatie als er geen bloedverlies is (asymptotisch)
- Overdracht als er wel bloedverlies is in de graviditeit (symptomatisch)

Indien bij 34 weken de placenta <1 centimeter van het ostium ligt dan is een overdracht geïndiceerd.

Een placenta previa totalis bij de SEO is reden voor een overdracht naar de 2e lijn.

NB: Er wordt bij echo placenta lokalisatie **niet** naar de biometrie gekeken. Indien dit verloskundig gezien nodig is dan zowel echo placenta lokalisatie als echo biometrie aanvragen. Er wordt dan dubbel tijd voor deze mevrouw ingepland en er worden dan 2 echo's gedeclareerd.

Graag aan zwangere vermelden dat de blaas leeg moet zijn en dat de mogelijkheid bestaat dat er een vaginale echo plaats kan vinden.

Bronnen:

NVOG. Modus partus bij placenta praevia marginalis, versie 12-11- 2015